

ด่วนที่สุด
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๕๕๔ ๓



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ซิกนุงนยา) ปี ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาวิทยุ ทท.๒/ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค ๒ ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๘๒/๑๓๓๔
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๒ (ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค ๒) แจ้งว่า
ในห้วงเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม ประเทศไทยพบการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
(ซิกนุงนยา) สูง ซึ่งมีพหะมาจากยุงลาย ดังนั้น ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.
พระราชทาน) จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ซิกนุงนยา)
ปี ๒๕๖๓ สำหรับจิตอาสาพระราชทาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดสกลนคร/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนคร (ศอ.จอส.
พระราชทาน จังหวัด) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอ
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ซิกนุงนยา) ให้กับ
ประชาชน โดยให้จิตอาสาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นแกนหลักในการดำเนินการตาม
มาตรการที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ที่ พว ๐๓๐๐/คองญ/ ๑๘๕

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
๗๓ ถนนอุทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ซิกนุงunya)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๒


- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ซิกนุงunya) ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒. มาตรการป้องกันโรคฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ในห้วงเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม ประเทศไทยพบการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ซิกนุงunya) สูง ซึ่งมีพหุมาจากยุงลาย รายงานการเฝ้าระวัง จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม ๙,๒๗๕ ราย ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ๕๒๙ ราย อัตราการป่วย ๑๓.๙๙ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต ๖ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ การกระจายของโรคตามภาค พบว่า ภาคกลาง มีอัตราป่วยสูงสุด เท่ากับ ๑๗.๒๗ ต่อประชากรแสนคน ในกลุ่มอายุ ๕ - ๑๔ ปี มีอัตราป่วยสูงสุด ๔๒.๘๒ ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่มี อัตราผู้ป่วยสะสมสูงที่ผ่านมามีต่อประชากรแสนคน ได้แก่ ระยอง อ่างทอง นครราชสีมา พิจิตร และระนอง ตามลำดับ และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ซิกนุงunya) ห้วงวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยสะสมรวม ๘๑๒ ราย อัตราการป่วย ๑.๒๒ ต่อประชากรแสนคน พบได้ทุกกลุ่มอายุ สูงสุดในกลุ่มอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี สัดส่วนอาชีพรับจ้างสูงสุด โดยเป็นผู้ป่วยในเขตเทศบาล ร้อยละ ๖๖ นอกเขตเทศบาล ร้อยละ ๓๔ ภาคกลาง มีการระบาดของโรคสูงสุด ร้อยละ ๑.๙๖ ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดในห้วงที่ผ่านมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำหรับระยอง จันทบุรี และสุรินทร์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงขอประสานความร่วมมือมายังท่าน ดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ซิกนุงunya) ให้ประชาชนทราบ โดยให้จิตอาสาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นแกนหลักในการดำเนินการ รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก 
(ล.วีตร รุจิตก)

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และ
ผู้บัญชาการสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
โทร / โทรสาร ๐ ๒๑๖๓ ๔๖๓๐

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ปี ๒๕๖๓ สำหรับจิตอาสาพระราชทาน

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค ๕๐๖ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม ๙,๒๗๕ ราย อัตราป่วย ๑๓.๙๙ ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ๕๒๙ ราย และมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน ๖ ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๐๖

นอกจากนี้ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ พบว่า มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของบ้าน โรงเรียน และวัดที่สำรวจในชุมชน ยังพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งถือว่ายังมีพาหะนำโรคในหลายพื้นที่ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็มีโอกาสแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้มากขึ้น จากการพยากรณ์โรค คาดการณ์ว่าปีนี้จะมียุงป่วยสูงถึง ๗๐,๐๐๐ ราย โดยในช่วงฤดูฝนอาจจะมีผู้ป่วยสูงถึง ๑๐,๐๐๐ รายต่อเดือนได้

ในช่วง ๔ สัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ ๑๕ มีนาคม ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ พบจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ดังนี้ ระยอง ระนอง อ่างทอง พิจิตร เลย ขอนแก่น นครราชสีมา กาฬสินธุ์ พังงา และร้อยเอ็ด ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)

ในวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยสะสมรวม ๘๑๒ ราย อัตราการป่วย ๑.๒๒ ต่อประชากรแสนคน พบได้ทุกกลุ่มอายุ สูงสุดในกลุ่มอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี สัดส่วนอาชีพรับจ้างสูงสุด รองลงมาคือนักเรียน และเกษตรกร เป็นผู้ป่วยในเขตเทศบาล ร้อยละ ๖๖ นอกเขตเทศบาล ร้อยละ ๓๔ ภาคกลาง มีการระบาดของโรคสูงสุด ร้อยละ ๑.๙๖ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้ป่วยจากทั้งหมด ๔๔ จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดในทั้งที่ผ่านมานี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ลำพูน ระยอง จันทบุรี สุรินทร์ และเชียงใหม่

แนวทางปฏิบัติจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

แผนการทำงานของจิตอาสา :

ช่วงฤดูการระบาด (พฤษภาคม - สิงหาคม)

- รมุ่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน รอบบริเวณบ้าน และสถานที่สำคัญ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมกับชุมชนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เกิดโรคทุกสัปดาห์
- ร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลายรอบ ๆ บ้านและชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์และนำเสนอข้อมูลกับชุมชน
- ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักถึงอันตราย การป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ถูกยุงกัด และดูแลที่อยู่อาศัยให้ปลอดลูกน้ำยุงลาย ทุกสัปดาห์

หลังฤดูการระบาด (กันยายน - ธันวาคม)

- พัฒนาสิ่งแวดล้อม รอบ ๆ บ้านและชุมชน ให้สะอาด อย่างต่อเนื่อง
- ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักถึงอันตราย การป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ถูกยุงกัด และดูแลที่อยู่อาศัยให้ปลอดลูกน้ำยุงลาย อย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติของจิตอาสา :

แนวทางปฏิบัติสำหรับจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ลงมือทำด้วยตนเอง ทำทันที
 - สำรวจ และกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านของตนเอง พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น คว่ำถ้วย ขาม กะละมัง ไม่ให้น้ำขัง ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ และเก็บเศษขยะ คูณภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว ไม่ให้มีน้ำขัง และหมั่นขัดทำความสะอาดภาชนะที่ใช้บรรจุ ทุกสัปดาห์
 - เก็บบ้าน ทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านให้เป็นระเบียบ คูณที่พักอาศัยให้ปลอดโปร่ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่างสม่ำเสมอ
๒. ร่วมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดยเฉพาะบ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล โดยใช้ไฟฉายส่องดูภาชนะ และวัสดุต่าง ๆ ที่สามารถขังน้ำได้

หากพบลูกน้ำ ต้องรีบแจ้งเจ้าบ้าน หรือเจ้าของพื้นที่ พร้อมแนะนำวิธีการกำจัดที่เหมาะสม ดังนี้

- โถงใส่น้ำดื่ม-น้ำใช้ ควรมีฝาปิดให้มิดชิด
- ถังพลาสติกเก็บน้ำ บ่อเก็บน้ำในห้องน้ำ-ห้องส้วม ควรปิดฝาให้มิดชิด หรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
- แจกันดอกไม้สด ทั้งพระ ศาลพระภูมิ ควรเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์
- ภาชนะเลี้ยงปลูด่าง หรือพืชน้ำอื่น ๆ ควรเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์หรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
- ถาดรองขาตู้กับข้าว ควรใส่เกลือแกง หรือผงซักฟอก
- จานรองกระถางต้นไม้ ไม่ให้มีน้ำขังหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
- ยางรถยนต์ ไม่ให้มีน้ำขังหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
- อ่างบัว ควรปล่อยปลากินลูกน้ำหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
- เศษวัสดุที่ขังน้ำได้ ควรคว่ำภาชนะเพื่อไม่ให้มีน้ำขังหรือทำลายทิ้ง

๓. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนในเรื่อง การดูแลความสะอาดบ้านตนเองไม่ให้มีแหล่ง

เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ถูกยุงกัด

๔. หากพบผู้ป่วยสงสัย ให้แนะนำไปพบแพทย์และแจ้งให้กักให้หน่วยงานภาครัฐทราบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ๑.) เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
- ๒.) ประชาชนเกิดความตระหนักต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)
- ๓.) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) เบาลง
